

Au cours de vos randonnées, vous pourrez croiser d'autres espèces d'oiseaux, à ne pas confondre avec les vautours.

Saurez-vous les identifier ?



Vautour fauve
Menacé de disparition



Aigle royal
Vulnérable



Circaète Jean le Blanc
Espèce commune



Milan royal
Vulnérable



Faucon crécerelle
Espèce commune



Faucon pèlerin
Espèce commune

Buse variable
Espèce commune

A VOS JUMELLES

LPO Mission Rapaces
© 2018

Rédaction et relecture :
Katia Daudigeos
Albane Dervil
Philippe Lecuyer
Raphaël Néouze
Pascal Orabi
Yvan Tariel
Noémie Ziletti

Illustrations :
François Desbordes
Caroline Bringuier

Maquette et composition :
Emmanuel Cailliet,
La Tomate Bleue

Impression : IDHP

Partenaires financiers :



AGIR pour la BIODIVERSITÉ

ZOOM SUR LA CUREE

CHRONOLOGIE TYPE



10 h 57 - le pie bavarde



11 h 42 - le grand corbeau



12 h 08 - le milan royal



12 h 45 - le vautour fauve



13 h 07 - le vautour moine



13 h 42 - le vautour percnoptère



15 h 21 - le renard roux et le milan royal



17 h 03 à plusieurs jours - le gypaète barbu

LA CURÉE, UN ÉQUARRISSAGE NATUREL

La définition de curée est « *Lutte acharnée pour obtenir quelque chose* ».

Ici effectivement c'est une mêlée sauvage où souvent le plus affamé est le plus agressif. Avant la curée, c'est une pie, des corbeaux ou des milans qui se posent à côté du cadavre découvert.

Les vautours eux surveillent et attendent d'être sûr de l'absence de danger pour s'approcher. C'est le vautour fauve, vautour le plus abondant, qui se nourrit le premier. Il préfère les parties moles (viscères et viande). C'est à ce moment-là que les curées sont les plus denses et les plus agitées. Un spectacle impressionnant. Puis viennent manger les vautours moines qui s'attaquent à des parties plus coriaces (tendons, ligaments, cartilages, ...) et ensuite arrive le vautour percnoptère qui avec son bec très fin, récupère tous les petits morceaux dispersés et fini le nettoyage de la carcasse. Le gypaète barbu qui lui mange les os, passe bon dernier une fois l'agitation terminée.



<http://rapaces.lpo.fr/>

NETTOYEURS DE LA NATURE

LES VAUTOURS



AGIR pour la BIODIVERSITÉ



2,50 à 2,95m

Kg 7 à 10 kg

Adulte




Juvenile

VAUTOUR MOINE

Le géant des arbres

Le Vautour moine se reproduit vers l'âge de 4-5 ans. Les couples occupent par petits groupes des zones favorables mais défendent chacun un territoire. Ils sont fidèles et construisent leur nid à la cime de grands pins, où ils pondent 1 œuf en fin d'hiver.

Moins grégaire, le Vautour moine arrive après les vautours fauves sur les carcasses. Grâce à son bec puissant et plus robuste, il consomme les parties les plus dures (la peau, les tendons ou les cartilages).



2,40 à 2,70m

Kg 7 à 11 kg

Adulte




Juvenile

VAUTOUR FAUVE

Il vit en colonie

Le Vautour fauve est adulte à l'âge de 4 ans et les couples sont fidèles. Ils vivent en groupes et chaque couple construit son nid dans une cavité rocheuse au cœur des falaises de la colonie. Sur un lit de branches, ils déposent chaque hiver un œuf.

Les vautours fauves se déplacent et prospectent toujours à plusieurs. Ensemble, ils trouvent plus facilement les carcasses et peuvent s'y retrouver très nombreux en quelques minutes ! C'est ce que l'on appelle la « curée ». Généralement, il est le premier des quatre vautours à arriver sur les carcasses. Il en consomme les tissus mous (muscles et viscères).



1,60m

Kg 2 à 2,5 kg

Adulte


Juvenile

VAUTOUR PERCNOPTÈRE

Le petit migrateur

Il est le plus petit vautour européen et le seul migrateur. Adulte vers 4 ans, il passe l'hiver et sa jeunesse en Afrique subsaharienne et rejoint le sud de l'Europe pour se reproduire au printemps.

Il aménage un nid en falaise, à l'aide de branches, où il dépose 1 à 2 œufs par an. Les couples choisissent des sites souvent isolés. Grâce à son bec long, fin et recourbé, il cure les os et « picore » les restes laissés par les autres vautours. Son alimentation est plus diversifiée : insectes, excréments, reptiles ou cadavres de petits mammifères.



2,60 à 2,90m

Kg 5 à 7 kg

Adulte

Juvenile

GYPAÈTE BARBU

Le mangeur d'os

Il atteint l'âge de se reproduire vers 8 ans.

Les couples occupent et défendent un vaste territoire. En hiver, ils construisent un nid en falaise avec de la laine. Ils y pondent 1 à 2 œufs par an.

Le Gypaète arrive parfois plusieurs jours après les autres vautours et achève le

travail d'équarisseur. Il se nourrit d'os, qu'il prélève sur les carcasses d'ongulés sauvages (chamois, mouflon, bouquetin, etc.) ou de bétail mort. Il peut avaler des os mesurant jusqu'à 30 cm ! Sinon, il transporte dans ses pattes les os trop longs et les laisse tomber pour les briser.

